

EDIZIONE ITALIANA

*Ruolo del dermatologo
pediatra nella malattia di
Fabry.* 4

*Nevo di Spitz congenito
agminato.* 10

*BCGite in un bambino
con immunodeficienza
comune variabile.* 14

*Lichen planopilaris e
alopecia areata.* 19

*Associazione tra neurofi-
bromatosi tipo 1 e piebal-
dismo.* 23

*Melanocitoma epitelioido
pigmentato in bambina di
8 anni.* 27

*Istiocitosi a cellule di
Langerhans multisiste-
mica.* 30

*Efficacia del losartan ora-
le nell'epidermolisi bollo-
sa distrofica recessiva.* 34

*Sclerosi tuberosa fami-
liare.* 38



*Cellulite necrotizzante in
neonato ex pretermine
con sepsi streptococcica
di gruppo B.* 43

*Dermatosi erosiva e ve-
scicolare congenita loca-
lizzata.* 46

*Utilizzo della dermosco-
pia con fluorescenza a
365 nm per la diagnosi
della pitiriasi versicolor
in un lattante.* 49

*Kerion celsi neonatale su
dermatite atopica.* 52

*Coda di fauno toracica
associata a disrafismo
spinale.* 55

*Cellulite purpurica del
volto dopo piercing auri-
colare.* 58

*Scabbia norvegese in
bambino di 4 mesi.* 60

*Un insolito effetto colla-
terale dei corticosteroidi
topici.* 62