

EDIZIONE ITALIANA

*Rachitismo in un bambino con ittiosi lamellare.* 71

*Eritema perineale e sindrome di Kawasaki.* 75

*Noduli sottocutanei multipli da rhabdomyosarcoma alveolare.* 78

*Incidenza di dermatosi neonatali in India.* 83

*Laser alessandrite nella ipertricosi cervicale anteriore.* 89

*Valutazione di sicurezza ed efficacia di una preparazione galenica di propranololo 1% in 89 casi di emangioma.* 93

*Vortice frontale: un nuovo segno di neurofibromatosi periferica?* 113

*Neurofibromatosi segmentaria associata a ipocromia a coriandoli.* 114

*Esiti di epidermolisi bollosa congenita distrofica.* 115

*Nevo melanocitario neuroide congenito.* 116



Fig. 1: a 3 mesi inizio propranololo orale; Fig. 2: a 14 mesi, sospendo propranololo; Fig. 3: a 30 mesi rimbalzo.

*Nevus spilus con aspetto di nevo melanocitario congenito alla nascita.* 117

*Nevo peloso con ipermelanosi perifollicolare a insorgenza tardiva.* 118

*Incompleto sviluppo dell'unghia dell'alluce.* 119

*Neurofibroma congenito con ipertricosi.* 120

*Rimbalzo di emangioma dopo sospensione del propranololo orale.* 121

*Turbe vascolari nel precursore metamerico.* 122

*Orticaria-angioedema su emangioma.* 124

*Cheratosi esfoliativa.* 125

*Iperpigmentazione del cavo orale tipo Laugier-Hunziker.* 126

*Dermatite artefatta in bambino di 10 anni.* 127

*Mastocitoma con bolla tardiva.* 128